

K FOL 50

1. GENERALIDADES

a) Nombre comercial	:	K FOL 50	500 g/Kg
b) Composición química	:	Potasio (K_2O)	200 g/Kg
		Fosforo (P_2O_5)	10 g/Kg
		Magnesio (MgO)	800 ppm
		Azufre (S)	100 ppm
		Boro (B)	12 ppm
		Fitohormonas	
c) Clase	:	Fertilizante foliar	
d) Formulación	:	Sólido	

2. PROPIEDADES FISICO - QUÍMICAS

a) Corrosividad	:	No corrosivo
b) Inflamación	:	No inflamable
c) Compatibilidad	:	Kalifol es compatible con fungicidas, insecticidas, acaricidas y otros fertilizantes foliares de uso común. Evitar las mezclas con Nitrato de Calcio y Nitrato de Magnesio.

3. TOXICOLOGIA

a) Antidoto en caso de intoxicarse	:	En caso de ingestión accidental se recomienda tratamiento sintomático
b) Precauciones para su uso	:	Lea la etiqueta ante usar el producto. Mantenga el envase en un lugar seco, alejado de los plaguicidas, especialmente herbicidas. Mantengase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Destruya el envase vacío

4. MODO DE ACCIÓN

Promueve una mayor síntesis de clorofila, regula la transpiración e interviene en la acumulación de carbohidratos en frutos y semillas, incrementando los rendimientos y mejorando la calidad de las cosechas

5. MODO DE APLICACIÓN : K FOL50 se aplica en aspersión en mezcla con la superficie cantidad de agua para lograr una adecuada distribución

6. USOS Y DOSIS

2 A 3 kg/Ha en cultivos anuales o de 100 a 150 g/mochilas de 20 L
4 a 6 kg/Ha en frutales o 500 g/100 de agua

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACION
Papa, camote	Al inicio de tuberización o engrsamiento de raíces Durante el crecimiento de tubérculos o raíces
Ají, tomate, pimiento, páprika, zapallo, sandia, melón, arveja, haba	Después del cuajado de frutos y vainas Durante el crecimiento y maduración de los frutos y vainas
Mandarino, naranjo, limón, vid, manzano, maracuya, mango palto, melocotón	Después del cuajado de frutos Durante el crecimiento y desarrollo de frutos
Brócoli, coliflor, alcachofa	Al inicio de la formación de la inflorescencia o cabeceo
Lechuga, acelga, apio, espinaca	Al finalizar el desarrollo vegetativo (6-7 pares de hojas)
Maíz, sorgo, cebada, trigo	Al inicio de la formación de la mazorca y/o panícula Durante el crecimiento y llenado de granos
Ajo, cebolla, poro	Al inicio del crecimiento del bulbo
Rosas, crisantemos, claveles	Durante la formación y crecimiento de botones florales Una semana antes del corte o cosecha
Algodón	Después de la floración y durante el crecimiento de bellotas
Arroz	Inicio de formación de panícula o embuchado Durante el espigado y llenado de granos
Quinua	Desde el inicio de llenado de grano (grano lechoso)

7. FORMULADOR/DISTRIBUIDOR : ITAM CROP SCIENCE,
Jr. Bogota 690 - comas - Lima
Cel: 915 173 388 / 963 239 614
ventas@itam.com.pe